

2020-2021 ሚዙሪ ትምህርት ቤት ክትባት መስፈርቶች

- ሁሉም ተማሪዎች ትምህርት ቤት ከመግባታቸው በፊት የወር፣ የቀን እና የዓመት ክትባትን ጨምሮ ወቅታዊ የክትባት ሁኔታ ማስረጃ ማቅረብ አለባቸው።
- የክትባት ልምምዶች አማካሪ ኮሚቴ (ACIP) የ4 ቀናት የእጩይታ ጊዜን ይፈቅድለዎታል። በሁሉም የክፍል ደረጃዎች ውስጥ ያሉ ተማሪዎች ከተከፈለበት ቀን እስከ አራት ቀናት ድረስ ክትባቶችን ሊወስዱ ይችላሉ።
- የሚያስፈልጉ ክትባቶች ሁሉንም ክፍተቶች ጨምሮ፣ በአሁኑ የክትባት አሰራሮች የጊዜ ሰሌዳ አማካሪ ኮሚቴ አማካይነት መሰጠት አለባቸው፣ <http://www.cdc.gov/vaccines/schedules/index.html>.
- በት/ቤት ለመቆየት "በሂደት ላይ ያሉ" ተማሪዎች የክትባት ሂደት (Pro. imm.P.14) በፋይል ላይ ሊኖራቸው ይገባል። በሂደት ላይ ማለት አንድ ልጅ የክትባት ቅደም ተከተሉን የጀመረው ለሚቀጥለው መጠን ቀጠሮ ይይዛል ማለት ነው። ይህ ቀጠሮ መቀመጫ አለበት እንዲሁም ለት/ቤቱ ወቅታዊ የሆነ ሪከርድን መስጠት አለበት። ቀጠሮው ካልተያዘ፣ ህፃኑ/ኗ በሂደት ላይ አይሆኑም፣ እና የማያከብር ነው ተብሎ ይፈረጅበታል። (ማለትም፣ የሄጉ ቢ ክትባት ተከታታይ ተጀምሯል ነገር ግን ህፃኑ በተከታታይ ውስጥ የሚቀጥለውን መጠን ለመቀበል ገና ብቁ አይደለም)።
- የሃይማኖታዊ (Imm.P.11A) እና የህክምና (Imm.P.12) ምክንያቶች መሠረት ነፃ ማድረግ ይፈቀዳል። ተገቢው ነፃ የመሆን ካርድ በፋይል ላይ መሆን አለበት። ክትባት ሊከለከሉ የሚችሉ በሽታዎች ወርሻኝ በሚከሰቱት ጊዜ ክትባቱን ያልጠበቁ ሕፃናት ከት/ቤት እንዲባረሩ ይደረጋል።

በትምህርት ላይ ለመሳተፍ ክትባት ግድ ይላል	በክፍል ደረጃ የሚታዘዙ ክትባቶች መጠን												
	ኪ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ዲቲኤፒ/ዲቲፒ/ዲቲ1	4+	4+	4+	4+	4+	4+	4+	4+	4+	4+	4+	4+	4+
ቲዲኤፒ ²									1	1	1	1	1
ምሲቪ ³ (ሚንገገጠጠል በ'ነድግዬተ)									1	1	1	1	2
አይፒቪ (ፖሊዮ) ⁴	3+	3+	3+	3+	3+	3+	3+	3+	3+	3+	3+	3+	3+
ምምር ⁵	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
ሄፓታይተስ ቢ ⁶	3+	3+	3+	3+	3+	3+	3+	3+	3+	3+	3+	3+	3+
ቫርኬላ ⁷	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1

1. ከአራተኛው ልደት በፊት ወይም በኋላ ያለው የመጨረሻ መጠን እና ከሰባተኛው የልደት ቀን በፊት የሕፃናት Pertussis የመጨረሻ መጠን።
ከፍተኛ መጠን ያለው፡ ስድስት መጠን።
2. 8-12 ክፍሎች፡ ትክትክ ክትባት የዞዞ ታዳጊ ያስፈልጋል።
3. 8ኛ ክፍል 8-11፡ አንድ የቪ.ቪ.ቪ መጠን ያስፈልጋል። ክትባት ከ 10 ዓመት እድሜ በኋላ መሰጠት አለበት።
የ12ኛ ክፍል፡ ዕድሜው 16 እና ከዛ በላይ ለሆነ ተማሪ የመጀመሪያ ክትባት ካልተሰጠ በስተቀር አንድ መጠን ብቻ የሚያስፈልግ ከሆነ ሁለት ክፍል የ MCV ሁለት መጠን ያስፈልጋል። ከ 16 ዓመት እድሜ በኋላ ቢያንስ አንድ መጠን መሰጠት አለበት።
4. መዋለ-ሕፃናት -10ኛ ክፍል፡ የመጨረሻ መጠን በአራተኛው ልደት ወይም ከዚያ በኋላ መሰጠት አለበት ። በሚቀጥለው እና በመጨረሻው መጠን መካከል ያለው የጊዜ ክፍተት ቢያንስ ስድስት ወር መሆን አለበት።
11-12 ክፍሎች፡ በአራተኛው ልደት ላይ ወይም በኋላ ያለፈው መጠን ። የአራት-መጠን አይፒቪ እና OPV ማንኛውም ጥምረት የተሟላ ተከታታይ ነው። **ከፍተኛ መጠን ያለው፡** አራት መጠን።
5. የመጀመሪያ መጠን በአሥራ ሁለት ወር ዕድሜ ላይ ወይም በኋላ መሰጠት አለበት።
6. በአንድ እና በሁለት መካከል ቢያንስ አራት ሳምንታት መኖር አለበት ፣ በሁለት እና በሦስት መካከል ቢያንስ 8 ሳምንታት; በአንድ እና በሰባት እና በመጨረሻው መጠን መካከል ቢያንስ 16 ሳምንታት ከ 24 ሳምንት እድሜ በታች መሆን የለበትም።
7. የመጀመሪያ መጠን በአሥራ ሁለት ወር ዕድሜ ላይ ወይም በኋላ መሰጠት አለበት።
የመዋለ ሕፃናት እስከ 10ኛ ክፍል፡ ለበሽታው አጥጋቢ መረጃ እንደመሆኑ መጠን ፈቃድ ያለው የጤና አጠባበቅ አቅራቢ ከዚህ ቀደም የ varicella (የዶሮ በሽታ) በሽታ ያለበትን ወር እና ዓመት የሚያሳይ ሰነድ በጽሑፍ ለት / ቤቱ በማስፈር ላይ ማስቀመጥ ይችላል።
11-12 ክፍሎች፡ ለበሽታው አጥጋቢ መረጃ እንደመሆናቸው ወላጅ / አሳዳጊ ወይም ሌም.አር.ኤል. ወይም DO ካለፈው ቀደም ሲል የ varicella (የዶሮ በሽታ) በሽታ ያለበትን ወር እና ዓመት የሚያረጋግጥ የጽሑፍ መግለጫ ለት / ቤቱ ማስፈርም ይችላሉ ።